

診療科
血液内科

疾患名
急性リンパ性白血病

レジメ名
JALSG ALL202-U induction

投与間隔
1コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
						week 1					2					3				4				5
						day	1	~	7	8	9	10	11	~	14	15	17	19	21	22	23	25	27	29
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.5mg/m ² /day	div	30min					●						●				●				●
テラルビシン	ピラルビシン	THP-ADM	25mg/m ² /day	div	1hr					●	●													
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	1200mg/m ² /day	div	1hr							●												
ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	L-Asp	6000U/m ² /day	div	4hrs											●	●	●	●		●	●	●	●
デカドロン	デキサメタゾン	DEX	10mg/m ² /day	div	1hr					●	●	●		●										
プレドニゾン①	プレドニゾン	PSL	60mg/m ² /day	po			●																	
プレドニゾン②	プレドニゾン	PSL	40mg/m ² /day	po												●	●	●	●	●	●	●	●	●
メソトレキセート	メトトレキサート	MTX	12mg/body/day	i.t			●			●										●				
キロサイド	シタラビン	Ara-C	30mg/body/day	i.t						●										●				
ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン		25mg/body/day	i.t						●										●				

備 考

- ・PSL①はday1～7の間、連日投与。
- ・PSL② 40mg/m²はday15～28の間連日投与し、以後減量する。

登録年月日
2012 年 10 月 15 日

登録No.
No. 277