

診療科  
消化器内科、消化器外科

疾患名  
結腸・直腸癌

レジメ名  
XELOX(CapeOX)+アバスチン

投与間隔  
1コース 3週間 計

| 商品名      | 一般名      | 略号    | 投与量                        | 投与方法 | 投与時間     | 投与日              |  |  |  |  |  |
|----------|----------|-------|----------------------------|------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
|          |          |       |                            |      |          | day1             |  |  |  |  |  |
| カペシタビン   | カペシタビン   | XEL   | 2000mg/m <sup>2</sup> /day | po   | 2weeks   | day1(夕)～day15(朝) |  |  |  |  |  |
| オキサリプラチン | オキサリプラチン | L-OHP | 130mg/m <sup>2</sup> /day  | div  | 2hrs     | ●                |  |  |  |  |  |
| アバスチン    | ベバシズマブ   | Bev   | 7.5mg/Kg/day               | div  | 30～90min | ●                |  |  |  |  |  |
|          |          |       |                            |      |          |                  |  |  |  |  |  |
|          |          |       |                            |      |          |                  |  |  |  |  |  |
|          |          |       |                            |      |          |                  |  |  |  |  |  |
|          |          |       |                            |      |          |                  |  |  |  |  |  |

備考  
・主な副作用：骨髄抑制、手足症候群、末梢神経障害、アレルギー、ショック、心障害、肝障害、腎障害、口内炎、下痢、肺炎等。  
day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日  
2013 年 3 12 日

登録No.  
No. 285