

診療科
消化器内科、消化器外科

疾患名
結腸・直腸癌

レジメ名
XELOX+セツキシマブ

投与間隔
1コース 3週間 計

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1	day8	day15		
ゼローダ	カペシタビン	XEL	2000mg/m ² /day	po	2weeks	day1(夕)~day15(朝)				
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ² /day	div	2hrs	●				
①アービタックス	セツキシマブ	Cmab	400mg/m ² /day	div	2hrs	●				
②アービタックス	セツキシマブ		250mg/m ² /day	div	1hr		●	●		

備考

- ・XELはDay1夕~Day15朝、L-OHPはDay1に投与し、3週間を1コースとする。(Day15夕~Day21は休薬)
- ・アービタックスは、1クール目のday1のみ①の投与量を2hrsかけてdivで実施する。
以降は②の投与量で実施する。
投与時間は、初回は2hrsとし、忍容性が良好であれば2回目以降は1hrとする。
- ・主な副作用: 骨髄抑制、手足症候群、末梢神経障害、アレルギー、ショック、心障害、肝障害、腎障害、口内炎、下痢、肺炎、皮膚障害等。

day1、8、15にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用
day8、15にデカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2013年 9月 11日

登録No.
No. 294