

診療科
泌尿器科

疾患名
根治切除不能、転移性腎細胞癌

レジメ名
オブジーボ療法

投与間隔
1コース 2 or 4 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
						day1						
オブジーボ(2週毎)	ニボルマブ		240mg/body	div	1 hr	●						
オブジーボ(4週毎)	ニボルマブ		480mg/body	div	1 hr	●						

備 考
免疫関連有害事象(重症筋無力症[頻度不明]・大腸炎[1.2%]・重症下痢[0.6%]・I 型糖尿病[頻度不明]・肝機能障害[2.9%]・肝炎[頻度不明])
・末梢性ニューロパチー[2.4%]・その他の神経障害:多発ニューロパチー・ギランバレー症候群・脱髄[頻度不明]・尿細管間質性腎炎[頻度不明]・
副腎機能不全[1.2%]・脳炎[頻度不明]・間質性肺炎[5.3%]・甲状腺機能低下症[10.6%]・甲状腺機能亢進症[1.8%]・甲状腺炎[2.4%]・
Inusion reaction[1]などの報告がある。適切な鑑別診断を行い、副腎皮質ホルモン剤の投与など適切な処置を行う。

枝分かれレジメンがある
350-2:240mg 2週毎レジメン 350-3:480mg 4週毎レジメン(3mg/kgの350-1レジメンは削除されている)

登録年月日
2016 年 9 月 7 日

登録No.
No. 350