

診療科
乳腺外科

疾患名
乳癌

レジメ名
パージェタ＋ハーセプチン＋ナベルビンorGEM療法

投与間隔
1コース 3週間 until PD

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day8				
ロゼウス	ビンレルビン	VNB	25mg/m ² /day	div	10min全開	●	●				
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	(1000mg/m ² /day)	(div)	(30min)	(●)	(●)				
①パージェタ	ペルズツマブ		840mg/body/day	div	1hr	●					
①ハーセプチン	トラスツマブ		8mg/Kg/day	div	90min	●					
②パージェタ	ペルズツマブ		420mg/body/day	div	1hr	●					
②ハーセプチン	トラスツマブ		6mg/Kg/day	div	90min	●					

備考

①は初回のみ、②は2回目以降の投与量とする。
副作用：心機能低下、骨髄抑制、静脈炎、倦怠感等

枝分かれレジメがある：
304-1:ビンレルビン初回導入用、304-2:ビンレルビン2回目以降用、304-3:GEM1000mg/m²初回導入用、
304-4:GEM1000mg/m²2回目以降用、304-5:GEM1250mg/m²初回導入用、304-6:GEM1250mg/m²2回目以降用

ビンレルビンレジメはday1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用 day8にグラニセトロン注3mg使用
GEMレジメはday1、8にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2014 年 2 月 5 日

登録No.
No. 304