

診療科
婦人科

疾患名
Ⅲ、Ⅳ期卵巣癌

レジメ名
TC-アバスチン療法

投与間隔
1コース 3~4 週間 計 コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | |
|---------|---------|-------|---------------------------|------|----------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | day1 | | | | |
| タキソール | パクリタキセル | TXL | 175mg/m ² /day | div | 3hrs | ● | | | | |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 5~6 | div | 1hr | ● | | | | |
| アバスチン | ベバシズマブ | | 15mg/Kg/day | div | 30~90min | ● | | | | |
| | | | | | | | | | | |

備考

手術後28日以内は、1コース目としてTC療法のみ行い、2コース目よりTC療法にアバスチンを加える。
2-6コース目はTC-アバスチン療法を行う。7-16コース目はアバスチン単剤とする。

枝分かれレジメがある：
306-1: TC[175/5.0]、306-2: TC[175/5.0]+Bev
306-3: TC[175/5.5]、306-4: TC[175/5.5]+Bev
306-5: TC[175/6.0]、306-6: TC[175/6.0]+Bev
306-7: Bevのみ

306-1、306-2、306-3、306-4、306-5、306-6はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用
306-7は静注制吐剤なし

登録年月日
2014年3月5日

登録No.
No. 306