

診療科
消化器外科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
mFOLFOX6＋セツキシマブ

投与間隔
1コース 2 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
						day1	day2	day8				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ² /day	bolus	3～15min	●						
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ² /コース	civ	46hrs	●	→					
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m ² /day	div	2hrs	●						
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ² /day	div	2hrs	●						
①アービタックス	セツキシマブ	Cmab	400mg/m ² /day	div	2hrs	●(初回)						
②アービタックス	セツキシマブ		250mg/m ² /day	div	1 hr	●(2回目以降)		●				

備 考

1コースを2週間とし、能な限り反復投与する。

主な副作用：骨髄抑制、粘膜障害（口内炎、下痢）、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック、末梢神経障害

枝分かれレジメがある：
307-1：初回導入用、307-2：二回目以降用

day1、8にグラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg使用
day8にデカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2014 年 3 月 5 日

登録No.
No. 307