血液内科

疾患名

急性リンパ性白血病

レジメ名 JALSG ALL202ーU maintenance therapy (1) 投与間隔

1コース 29日間

計 4コース

商品名	一般名	略号	投与量		投与 時間	day1	day8		与日 day28	day29				
メソトレキセート	メトトレキサート	MTX	150mg∕m [*] ∕day	i.v		•		•		•				
ロイケリン	メルカプトプリン	6MP	50mg∕m³∕day	ро		•-			>●					
メソトレキセート	メトトレキサート	MTX	12mg/body/day	i.t		(●)	(()							
キロサイド	シタラビン	Ara-C	30mg∕body∕day	i.t		(●)	(•)							
ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン		25mg/body/day	i.t		(●)	(•)							
								·		·			·	
					·		·			·	·		·	

備考

- ・maintenanse therapyはコース(1)からコース(4)まで4サイクル、計16コース行う。
- ・各コース終了から次コースの開始の間隔は原則として2週間とする。
- ・アロプリノール使用時は半量に減量する。内服は1日1回眠前に行う。
- 初診時、中枢神経病変陽性例の初回コースは次のように変更となる。
 MTX 150mg/m2 iv day29、6MP 50mg/m2 po day1-28、髄注 day1、8
 頭蓋放射線照射 12Gy(1.5Gy×8) day1-12。 頭蓋照射施行例は照射終了後の髄注は行わない。
 ・頭蓋照射を行わない症例では、髄注は1~3コース目に施行し、4コース目には施行しない。
- •day1、15、29にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日 2014 年 9 月 3 日 登録No.

No. 313