| 診療 | 科 |
|----|---|
|----|---|

婦人科

疾患名

進行•再発卵巣癌、卵管癌、腹膜癌

レジメ名

GC-アバスチン療法

投与間隔

1コース

3 週間 計 6~10 コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | day1 | day8 | | | | | |
| ゲムシタビン | ゲムシタビン | GEM | 1000mg/m²/day | div | 30min | | | | | | | |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 4 | div | 1hr | • | | | | | | |
| アバスチン | ベバシズマブ | Bev | 15mg/Kg/day | div | 30~90min | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

考

効果ある場合、GC-アバスチン療法を6-10コース行う。 GCーアバスチン療法後は病勢進行までアバスチン単剤で維持療法を行う。

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用しday8にグラニセトロン注3mg、デカドロン注3.3mg使用

登録年月日

2015 年 7月 1日

登録No.

No. 322