

診療科
血液内科

疾患名
再発・難治性多発性骨髄腫

レジメ名
ERd療法(3コース以降)

投与間隔
1コース 4 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1	day2	day8	day9	day15	day16	day21	day22
エムプリシティ	エロツズマブ		10mg/kg/day	div	注)1	●				●			
レブラミド	レナリドミド		25mg/body/day	p.o.		day1～21連日投与							
レナデックス	デキサメタゾン		28mg/body/day	p.o.		●				●			
レナデックス	デキサメタゾン		40mg/body/day	p.o.				●					●
デキサメタゾン	デキサメタゾン		8mg/body/day	iv		●				●			

備 考

- ・注意すべき副作用: infusion reaction、血液毒性(好中球・リンパ球減少、貧血、血小板減少)、間質性肺炎など。
- ・前投与: 本剤投与3時間前までにDEX28mg po、45分前までにDEX8mgiv、30分前までに抗ヒスタミン薬、H2ブロッカー、アセトアミノフェン(300-1000mg)を投与する。
- ・支持療法: 血栓予防としてバイアスピリンの投与を考慮する。

登録年月日
2017 年 6 月 7 日

登録No.
No. 369-2