

診療科
血液内科

疾患名
再発・難治性CCR4陽性末梢性T細胞リンパ腫、再発・難治性CCR4陽性皮膚T細胞リンパ腫

レジメ名
モガムリズマブ療法

投与間隔
1コース 8週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
						day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day50	day57
ポテリジオ	モガムリズマブ		1mg/kg/day	div	2hr	●	●	●	●	●	●	●	●	●

備考

- ・infusion reaction(発熱、悪寒、頻脈)を軽減させるために、本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ステロイドホルモン剤等の前投薬を行うこと。
- ・中毒性表皮壊死融解症(TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johanson症候群)などの全身症状を伴う重度の皮膚障害が報告されているため、本剤投与開始時より皮膚科と連携の上治療を行うこと。
- ・重度の皮膚障害は本剤投与中のみならず、投与終了後数週間以降も発現することが報告されているため、観察を行うこと。
- ・皮膚障害発現早期から副腎皮質ホルモン剤、抗アレルギー剤、抗ヒスタミン剤の使用など適切な処置を行うこと。
- ・重度な皮膚障害が発現した場合は投与を中止し、適切な処置を行うこと。

登録年月日
2017年8月2日

登録No.
No. 373