

診療科
消化器内科・消化器外科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
ザルトラップ＋FOLFIRI

投与間隔
1コース 2 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
						day1	day2					
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ² /day	bolus	2~4min	●						
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ² /コース	civ	46hrs	●	→					
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m ² /day	div	2hrs	●						
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ² /day	div	2hrs	●						
ザルトラップ	アフリベルセプトヘータ	AFL	4mg/kg/day	div	1hr	●						

備 考

1コースを2週間とし、可能な限り反復投与する。

・二次化学療法として使用する。

主な副作用：嘔気、嘔吐、貧血、白血球減少、下痢、出血、血栓症、高血圧、尿蛋白

枝分かれレジメがある
 378-1:5FU 携帯型持続注入ポンプ使用、378-2:5FU 輸液に混注(入院用)

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2017 年 11 月 1 日

登録No.
No. 378