

診療科  
消化管内科、外科

疾患名  
進行・再発大腸癌

レジメ名  
ロンサーフ+アバスチン療法

投与間隔  
1コース                      4 週間                      計                      PDまで

| 商品名   | 一般名                 | 略号      | 投与量                      | 投与方法 | 投与時間     | 投与日       |    |            |    |  |  |       |  |
|-------|---------------------|---------|--------------------------|------|----------|-----------|----|------------|----|--|--|-------|--|
|       |                     |         |                          |      |          | day1      |    |            |    |  |  | day15 |  |
| ロンサーフ | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠 | TAS-102 | 70mg/m <sup>2</sup> /day | p.o  |          | day1～day5 | 休薬 | day8～day12 | 休薬 |  |  | 休薬    |  |
| アバスチン | ベバシズマブ              | Bev     | 5mg/kg                   | div  | 30～90min | ●         |    |            |    |  |  | ●     |  |
|       |                     |         |                          |      |          |           |    |            |    |  |  |       |  |
|       |                     |         |                          |      |          |           |    |            |    |  |  |       |  |
|       |                     |         |                          |      |          |           |    |            |    |  |  |       |  |
|       |                     |         |                          |      |          |           |    |            |    |  |  |       |  |

備 考

ロンサーフは標準量(35mg/m<sup>2</sup>/回)を朝食後及び夕食後の1日2回5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。  
これを2回繰り返したのち14日間休薬する。以上を1コースとして投与を繰り返す。

静注制吐剤なし

登録年月日  
2018 年 10 月 3 日

登録No.  
No. 393