診療科	
乳腺外科	

疾患名

進行・再発乳がん

レジメ名

MMC/MTX(+Her)療法

投与間隔

1コース 6or4週間

計 6コース

	1	т			1						
商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day15	day29			
マイトマイシン	マイトマイシン	MMC	8mg∕ <b>m</b> <sup>*</sup> ∕ day	div	全開	•					
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	60mg∕m <sup>*</sup> ∕day	div	30min	•					
ハーセプチン	トラスツズマブ	Her	初回4mg/kg、以降2mg/kg	div	90min	•					
マイトマイシン	マイトマイシン	MMC	8mg∕ <b>m</b> <sup>1</sup> ∕day	div	全開	•					
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	60mg∕m <sup>*</sup> ∕day	div	30min	•					
ハーセプチン	トラスツズマブ	Her	初回4mg/kg、以降2mg/kg	div	90min	•					

## 備考

※1コース:6週間(day29のMTX、Her有り) または1コース:4週間(day29のMTX、Her無し)で投与。

枝分かれレジメあり

397-1:6週MMC/MTX、397-2:4週MMC/MTX、

397-3:6週MMC/MTX+Her初回導入用、397-4:6週MMC/MTX+Her二回目以降用 397-5:4週MMC/MTX+Her初回導入用、397-6:4週MMC/MTX+Her二回目以降用

day1、15、29にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日

2018年 12 月 5日

登録No.

No. 397