

診療科  
血液内科

疾患名  
Ph1(-)急性リンパ性白血病

レジメ名  
JALSG ALL202-O consolidation(C1,C4) therapy

投与間隔  
1コース 3 週間 計 コース

| 商品名      | 一般名      | 略号   | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間      | 投与日  |      |      |  |  |  |  |  |
|----------|----------|------|----------------------|------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|          |          |      |                      |      |           | day1 | day2 | day3 |  |  |  |  |  |
| シタラビン    | シタラビン    | AraC | 2g/m <sup>2</sup> x2 | div  | 3時間12時間間隔 | ●●   | ●●   | ●●   |  |  |  |  |  |
| エトポシド    | エトポシド    | VP16 | 100mg/m <sup>2</sup> | div  | 1時間       | ●    | ●    | ●    |  |  |  |  |  |
| デカドロン    | デキサメサゾン  | DEX  | 40(33)mg/body        | div  | 1時間       | ●    | ●    | ●    |  |  |  |  |  |
| メソトレキセート | メトトレキサート | MTX  | 15mg/body            | it   |           | ●    |      |      |  |  |  |  |  |
| デカドロン    | デキサメサゾン  | DEX  | 3.3mg/body           | it   |           | ●    |      |      |  |  |  |  |  |

備 考

- ・葉酸の併用: 初回投与10日以上前から、葉酸として1日1回1.0～1.25mgを連日経口投与(本剤終了日から30日後までは継続)
- ・VB12の併用: 初回投与10日以上前から、VB12として1日1回1mgを8～10週ごとに筋肉内投与(本剤投与中は継続)
- ・本剤投与前に歯科コンサルトを行い、口腔内のスクリーニング・口腔ケア指導を行う。
- ・注意する副作用: 粘膜炎、骨髄抑制、皮膚障害、感染症、腫瘍崩壊症候群、間質性肺炎など

登録年月日  
2019年 2月 6日

登録No.  
No. 408