

診療科
血液内科

疾患名
中枢神経悪性リンパ腫

レジメ名
MR-CHOP

投与間隔
1コース 3週間 計 6 コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day | day | day | |
| メソトレキサート | メソトレキサート | MTX | 2g/m ² | div | 3時間 | ● | | | | | | | | |
| リツキシマブ | リツキシマブ | | 375mg/m ² | div | * | ● | | | | | | | | |
| エンドキサン | シクロフォスファミド | CPA | 750mg/m ² | div | 2時間 | | | ● | | | | | | |
| ドキシソルビシン | ドキシソルビシン | ADM | 50mg/m ² | div | 30分 | | | ● | | | | | | |
| オンコビン | ビンクリスチン | VCR | 1.4mg/m ² | i.v or div | 15分 | | | ● | | | | | | |
| プレドニゾロン | プレドニゾロン | PSL | 100mg/body/day | po | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |

備 考

・リツキシマブの副作用軽減のため投与前にアセトアミノフェン 0.5gを服用、およびポララミン1Aを投与する。

登録年月日
2019年 2月 6日

登録No.
No. 412