

診療科
血液内科

疾患名
濾胞性リンパ腫

レジメ名
G-CHOP療法(サイクル1)

投与間隔
1コース 3 週間 計 1 コース(計8コース)

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1	day2	day3	day4	day5	day8	day15	day
ガザイバ	オビヌツズマブ	G	1000mg/body/day	div	4時間15分	●					●	●	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m2	div	2時間	●							
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	50mg/m2	div	30分	●							
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m2 (max 2mg)	div	15分	●							
プレドニゾロン	プレドニゾロン	PSL	100mg/body/day	po		●	●	●	●	●			

備 考
・Infusion reaction対策として、ガザイバ投与30分前にジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンの前投与を行う。 ・1回目G-CHOP療法(サイクル1)(No.413)、2-6回目以降G-CHOP療法(サイクル2-6)(No.414)へ移行し、7-8回目以降G-CHOP療法(サイクル7-8)(No.415)へ移行し、その後オビヌツズマブ維持療法(No.418)を行う。 day1にグラニセトロン注3mg使用しday8、day15は静注制吐剤なし。

登録年月日
2019年 3月 日

登録No.
No. 413