

診療科
呼吸器内科

疾患名
進行再発非扁平上皮非小細胞肺がん

レジメ名
CBDCA+PEM+テセントリク療法

投与間隔
1コース 3 週間 計 4～6 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1					
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC6/day	div	1hrs	●					
ペメトレキセド	ペメトレキセド	PEM	500mg/m ² /day	div	10min	●					
テセントリク	アテゾリズマブ		1200mg/body/day	div	1hrs	●					

備 考

アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
アリムタ初回投与7日以上前に1mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。
上記レジメ4～6コース終了後、SD以上ならば、PEM+テセントリクの維持療法を行う。

枝分かれレジメがある:
436-1: 通常レジメ、436-2: アロカリス併用レジメ

436-1はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用
436-2はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注3.3mg、アロカリス注235mg使用

2022/5 アリムタからペメトレキセドへ変更

登録年月日
2019年 12月 4日

登録No.
No. 436