

診療科
乳腺外科

疾患名
乳がん PD-L1陽性 TNBC

レジメ名
テセントリク+アブラキサン併用療法

投与間隔
1コース 4週間 計 Until PD

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------------------------|------|-------|------|------|-------|--|--|--|
| | | | | | | day1 | day8 | day15 | | | |
| テセントリク | アテゾリズマブ | | 840mg/body/day | div | 60min | ● | | ● | | | |
| アブラキサン | nab-パクリタキセル | nab-PAC | 100mg/m ² /day | div | 30min | ● | ● | ● | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

備考
・副作用
間質性肺炎、肝機能障害、肝炎、大腸炎、重度の下痢、膵炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障害、脳炎、髄膜炎、神経障害、重症筋無力症、重度の皮膚障害、腎機能障害、筋炎、横紋筋融解症、心筋炎、infusion reavtio

day1、8、15にグラニセトン注3mg、デカドロン注3.3mg使用

登録年月日
2020年 月 日

登録No.
No. 440