

診療科
血液内科

疾患名
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

レジメ名
Pola-BR療法(1サイクル)

投与間隔
1コース 3週間 計 1 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2	day3			
リツキシマブ	リツキシマブ		375mg/m ² /day	div	*	●					
ポライビー	ポラツズマブ		1.8mg/kg/day	div	90min		●				
トレアキシン	ベンダムスチン		90mg/m ² /day	div	10min		●	●			

備考

*1: リツキサン投与時間、前投薬などの注意事項はリツキサン添付文書に従う。なお前投薬には100mgのPSLもしくは同程度のステロイド追加可。

*2: ポライビー初回投与時は投与開始30-60分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤(リツキサンと同じ前投薬)、ステロイド(量は上記)投与を行い、投与後トレアキシン投与まで30分間の観察時間を設ける。2回目投与以降はポライビーをday1、2投与とするが、リツキシマブ投与後30分間の観察時間をおいてからポライビーを投与する。その際初回投与時の認容性が良好であれば、ポライビーの投与は30分に短縮可。

- ・抗ヘルペスウイルス薬、抗ニューモシスチス薬の予防投与を考慮。
- ・2022/8/1 添付文書改訂に伴いトレアキシン点滴時間を1時間から10分に変更した。
- ・day2にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用、day3にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2021年 6月 9日

登録No.
No. 470-1