診療科
呼吸器内科

疾患名
EGFR陽性肺癌

レジメ名
CBDCA+PEM+ゲフィチニブ併用療法

投与間隔
1コース 3 週間 計 6 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1				
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC5/day	div	1hrs	●				
アリムタ	ペトレキセド	PEM	500mg/m ² /day	div	10min	●				
イレッサ	ゲフィチニブ		250mg/body/day	p.o		day1-day21まで連日内服				

備考

1)アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
パンビタンはアリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
アリムタ初回投与7日以上前にフレズミン1mgを筋肉内投与。その後約9週毎に反復投与。
フレズミンはアリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。

2)6コース施行後SD以上の場合、PEM+ゲフィチニブ維持療法を行う。

493-1はday1にパロノセトロン注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用
493-2はday1にパロノセトロン注0.75mg、デカドロン注3.3mg、アロカリス注235mg使用

2022/5 アリムタからペトレキセドへ変更

登録年月日
2022年 3月 9日

登録No.
No. 493