

診療科
呼吸器内科

疾患名
EGFR陽性肺癌

レジメ名
PEM＋ゲフィチニブ維持療法

投与間隔
1コース 3 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1					
ペメトレキセド	ペメトレキセド	PEM	500mg/m ² /day	div	10min	●					
イレッサ	ゲフィチニブ		250mg/body/day	p.o		day1-day21まで連日内服					

備 考

1) アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
パンビタンはアリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
アリムタ初回投与7日以上前にフレスミン1mgを筋肉内投与。その後約9週毎に反復投与。
フレスミンはアリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。
2) 本レジメンは、CBDCA+PEM+ゲフィチニブ療法を6コース施行しSD以上の症例に維持療法として行う。

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注3.3mg使用

2022/5 アリムタからペメトレキセドへ変更

登録年月日
2022 年 3 月 9 日

登録No.
No. 494