

診療科  
血液内科

疾患名  
急性骨髄性白血病

レジメ名  
Ven+AZA療法

投与間隔  
1コース 4週間 計 コース

| 商品名    | 一般名     | 略号  | 投与量       | 投与方法 | 投与時間 | 投与日  |      |      |      |      |      |      |   |       |
|--------|---------|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-------|
|        |         |     |           |      |      | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6 | day7 | ~ | day28 |
| ベネクレスタ | ベネトクラクス | Ven | 100~400mg | 経口   |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ● | ●     |
| ビダーザ   | アザシチジン  | AZA | 75mg/m2   | 皮下注  |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |   |       |
|        |         |     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |       |

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

- ・通常、成人にはベネトクラクスとして、用量漸増期は1日目に100mg、2日目に200mg、3日目に400mgをそれぞれ1日1回、食後に経口投与する。その後の維持投与期は、400mgを1日1回、食後に経口投与する。
- ・中程度以上のCYP3A阻害剤と併用する場合には、ベネクレスタを半量以下に減量する(適正使用ガイドを参照する)。

登録年月日  
2023年3月1日

登録No.  
520