

診療科
呼吸器内科

疾患名
肺癌(非小細胞肺癌)

レジメ名
オプジーボ+カルボプラチン+パクリタキセル療法

投与間隔
1コース
3 週間
計3 コース

商品名	一般名	略号	投与量		投与方法	投与時間		投与日						
			単位	単位		単位	day1	day	day	day	day	day		
オプジーボ	ニボルマブ		360	mg/body	点滴静注	30	分	●						
パクリタキセル	パクリタキセル		175 or 200	mg/m ²	点滴静注	3	時間	●						
カルボプラチン	カルボプラチン		AUC 5 or 6		点滴静注	1	時間	●						

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

- 副作用としては、間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎・下痢、消化管穿孔、甲状腺機能異常、腎機能障害、筋炎、心筋炎、重症筋無力症、脳炎、神経障害、皮膚障害、infusion reactionなどの免疫関連有害事象が予測され、適切なモニタリングと治療が必要である。
- 536-1はday1にパロノセトロン注0.75mg、デカドロン注13.2mg使用
536-2はday1にパロノセトロン注0.75mg、デカドロン注3.3mg、アロカリス注235mg使用

登録年月日
2023 年 6 月 7 日

登録No.
No. 536