

診療科  
消化管内科・消化器外科

疾患名  
胃癌、食道胃接合部癌

レジメ名  
ビロイ+mFOLFOX6(初回)

投与間隔  
1コース  
2週間  
初回のみ

| 商品名      | 一般名      | 略号 | 投与量  |                   | 投与方法 | 投与時間 |    | 投与日  |     |     |     |
|----------|----------|----|------|-------------------|------|------|----|------|-----|-----|-----|
|          |          |    |      | 単位                |      |      | 単位 | day1 | day | day | day |
| ビロイ      | ゾルベツキシマブ |    | 800  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 |      | 時間 | ●    |     |     |     |
| オキサリプラチン | オキサリプラチン |    | 85   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 2    | 時間 | ●    |     |     |     |
| レボホリナート  | レボホリナート  |    | 200  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 2    | 時間 | ●    |     |     |     |
| フルオロウラシル | フルオロウラシル |    | 400  | mg/m <sup>2</sup> | 静注   | 5    | 分  | ●    |     |     |     |
| フルオロウラシル | フルオロウラシル |    | 2400 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 46   | 時間 | ●    |     |     |     |
|          |          |    |      |                   |      |      |    |      |     |     |     |

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

ビロイは初回は800mg/m<sup>2</sup>での投与。(2回目以降は400mg/m<sup>2</sup>)  
day1にデカドロン注(9.9mg)、アロカリス注(235mg)、パロノセトロン注(0.75mg)、ポララミン注(5mg)、ガスター注(20mg)を使用する。

登録年月日  
2024 年 9月 4日

登録No.  
No. 578