

診療科  
消化管内科・消化器外科

疾患名  
胃癌、食道胃接合部癌

レジメ名  
ビロイ+mFOLFOX6(2回目以降)

投与間隔  
1コース 2週間 PDまで

商品名	一般名	略号	投与量		投与方法	投与時間		投与日			
				単位			単位	day1	day	day	day
ビロイ	ゾルベツキシマブ		400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		時間	●			
オキサリプラチン	オキサリプラチン		85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2	時間	●			
レボホリナート	レボホリナート		200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2	時間	●			
フルオロウラシル	フルオロウラシル		400	mg/m <sup>2</sup>	静注	5	分	●			
フルオロウラシル	フルオロウラシル		2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46	時間	●			

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

ビロイは初回は800mg/m<sup>2</sup>での投与。(2回目以降は400mg/m<sup>2</sup>)  
day1にデカドロン注(9.9mg)、アロカリス注(235mg)、パロノセトロン注(0.75mg)、ポララミン注(5mg)、ガスター注(20mg)を使用する。

登録年月日  
2024年 9月 4日

登録No.  
No. 579