

診療科  
乳腺科

疾患名  
進行再発乳癌

レジメ名  
ダトロウェイ療法

投与間隔  
1コース          3          週間          PDまで

| 商品名    | 一般名            | 略号       | 投与量 |       | 投与方法 | 投与時間    |    | 投与日  |     |     |     |
|--------|----------------|----------|-----|-------|------|---------|----|------|-----|-----|-----|
|        |                |          |     | 単位    |      |         | 単位 | day1 | day | day | day |
| ダトロウェイ | ダトポタマブ デルクステカン | Dato-DXD | 6   | mg/kg | 点滴静注 | 1.5～0.5 | 時間 | ●    |     |     |     |
|        |                |          |     |       |      |         |    |      |     |     |     |

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

前投薬: パロノセトロン0.75mg+ポラミン5mg+デカドロン6.6mg、 カロナール600mg内服  
(添付文書: 本剤の投与前に抗ヒスタミン剤及び解熱鎮痛剤を投与すること。と記載あり)

予測される副作用: 口内炎(58.6%)、悪心(55.8%)、角膜障害(18.6%)、Infusion reaction(8.9%)、間質性肺炎(3.3%)など

登録年月日  
2025 年          4月          11日

登録No.  
No. 606-1