

診療科  
呼吸器内科

疾患名  
肺腺癌

レジメ名  
ライブリバント+ラズクルース療法  
(1コース目用・BW80kg未満)

投与間隔  
1コース 4週間 計 1コース

| 商品名     | 一般名     | 略号 | 投与量  |         | 投与方法 | 投与時間 |    | 投与日           |      |      |       |       |       |  |
|---------|---------|----|------|---------|------|------|----|---------------|------|------|-------|-------|-------|--|
|         |         |    | 単位   |         |      | 単位   |    | day1          | day2 | day8 | day15 | day22 | day28 |  |
| ラズクルース  | ラゼルチニブ  |    | 240  | mg/body | 経口   |      |    | 連日服用 (d1~d28) |      |      |       |       |       |  |
| ライブリバント | アミバンタマブ |    | 350  | mg/body | 点滴静注 | 4    | 時間 | ●             |      |      |       |       |       |  |
|         |         |    | 700  | mg/body | 点滴静注 | 4    | 時間 |               | ●    |      |       |       |       |  |
|         |         |    | 1050 | mg/body | 点滴静注 | 3    | 時間 |               |      | ●    |       |       |       |  |
|         |         |    | 1050 | mg/body | 点滴静注 | 2    | 時間 |               |      |      | ●     |       |       |  |
|         |         |    | 1050 | mg/body | 点滴静注 | 2    | 時間 |               |      |      |       | ●     |       |  |

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

静注制吐剤なし  
体重 80kg未満と80kg以上でライブリバント投与量が変わる  
治療開始後4ヶ月間は、アピキサバン(エリキュース)1回2.5mgを1日2回内服(ただし、元々DOAC内服している場合は、そちらを優先)  
infusion reaction予防として、  
初回(d1)は2日前~当日朝まで、デカドロン8mg/回 朝・夕で内服  
day1、day2、day8はライブリバント開始前にカロナール内服とデカドロン9.9mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mgを注射し、  
day15はライブリバント開始前にカロナール内服とファモチジン20mg+ポララミン6mgを注射する。

登録年月日  
2025年 6月 4日

登録No.  
No. 620-1