

診療科  
血液内科

疾患名  
移植非適応多発性骨髄腫

レジメ名  
Dara-VRD移植非適応(1-2サイクル目)

投与間隔  
1サイクル 3週間 計 2サイクル

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day4	day8	day11	day15	day21
ダラキューロ	ダラツムマブ		1800mg/body	皮下注	3-5分	●		●		●	
ベルケイド	ボルテゾミブ	BOR	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注		●	●	●	●		
レブラミド	レナリドミド	LEN	25mg/body	経口		day1-14					
レナデックス	デキサメタゾン	DEX	20mg/body	経口		day1-2	day4-5	day8-9	day11-12	※	

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)  
静注制吐剤なし  
ダラキューロ投与の1~3時間前に、副腎皮質ホルモン製剤(レナデックス)、カロナール900mg、ポララミン2mgを内服する。  
初回投与時はモンテルカスト10mg併用を推奨。  
※ダラキューロ前投薬として、day15はレナデックス20mgを投与  
75歳以上または低体重(BMI<18.5mg/m<sup>2</sup>)の患者ではDEX20mg/bodyをday1,4,8,11投与に変更する

登録年月日  
2025年 7月 4日

登録No.  
628