

診療科

血液内科

疾患名

移植適応多発性骨髄腫

レジメ名

Dara-VRD移植適応(1-2サイクル目)

投与間隔

1サイクル 4 週間 計 2サイクル

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
						day1	day4	day8	day9	day11	day15	day21	day22	day28
ダラキューロ	ダラツムマブ		1800mg/body	皮下注	3-5分	●		●			●		●	
ベルケイド	ボルテゾミブ	BOR	1.3mg/m ²	皮下注		●	●	●		●				
レブラミド	レナリドミド	LEN	25mg/body	経口		day1-21								
レナデックス	デキサメタゾン	DEX	40mg/body	経口		day1-4	※	day9-12		※		※		

備 考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

静注制吐剤なし

ダラツムマブ投与開始1〜3時間前に、副腎皮質ホルモン製剤(レナデックス)、カロナール900mg、ポララミン2mgを内服する。

初回投与時はモンテルカスト10mg併用を推奨。

※day8、day15、day22はダラキューロ前投薬としてレナデックスを投与。(臨床試験では、d8はレナデックス20mg、day15、day22はレナデックス10mgを投与。前クールでinfusion reactionを認めた場合や患者の状態に応じて、医師判断にて用量調整することあり)

登録年月日

2025年 9月 3日

登録No.

631