

診療科
血液内科

疾患名
再発難治性多発性骨髓腫

レジメ名
タービー療法(A法)1コース目

投与間隔
1コース 3週間 計 1コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | day1 | day3 | day5 | day12 | day | day | day | day |
| タービー | トアルクエタマブ | | 0.01mg/kg | 皮下注 | | ● | | | | | | | |
| タービー | トアルクエタマブ | | 0.06mg/kg | 皮下注 | | | ● | | | | | | |
| タービー | トアルクエタマブ | | 0.4mg/kg | 皮下注 | | | | ● | ● | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)
1日目に0.01mg/kgを皮下投与し、2-4日間隔で0.06mg/kg、0.4mg/kgを順に投与した後、7日おきに0.4mg/kgを毎週皮下投与
(レジメン上は2日間隔として作成したが適宜調整可)
用量漸増期にはDEX16mg、ポララミン2mg、カロナール900mgを各1-3時間前に前投薬として投与し、投与後48時間の入院管理を行う。
皮膚関連事象、味覚不全、爪関連事象など頻度が高く注意する

電子カルテへの登録は必要時は医師から連絡を行っていただき行う方針とした。

登録年月日
2025年12月3日

登録No.
No. 645