

診療科

血液内科

疾患名

自家移植適応悪性リンパ腫(移植前処置)

レジメ名

LEED療法

投与間隔

1コース 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
						day-4	day-3	day-2	day-1	day0	day	day
アルケラン	メルファラン	MEL	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分				●			
エトポシド	エトポシド	ETP	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	8時間	●	●	●				
エンドキサン	シクロフォスファミド	CPA	60mg/kg	点滴静注	2時間	●	●					
デカドロン	デキサメサゾン	DEX	33mg/body	点滴静注	30分	●	●	●	●			
幹細胞輸注											※	

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

前投薬として、Day1にアロカリス、パロノセトロンを使用する。

出血性膀胱炎の予防にメスナを投与する(CPA投与時、投与4時間後、投与8時間後に24mg/kgを投与する)

エトポシドは125mg/m<sup>2</sup>を5%Glc500mlに混ぜて、2時間×4回にわけて投与する。

登録年月日

2025年12月3日

登録No.

No. 654