

診療科
呼吸器内科

疾患名
非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)

レジメ名
イミフィンジ+CBDCA+PEM療法

投与間隔
1コース 3週間 計 4コース

商品名	一般名	略号	投与量		投与方法	投与時間		投与日			
			単位			単位		day	day	day	day
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC5		点滴静注	1	hr	●			
ペメトレキセド	ペメトレキセド	PEM	500	mg/m ²	点滴静注	10	min	●			
イミフィンジ	デュルバルマブ	Durvalumab	1500	mg/body	点滴静注	1	hr	●			

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

- ・術前イミフィンジ+CBDCA+PEM療法を最大4コース実施。術後はイミフィンジ単剤療法へ移行。全身状態・臨床検査値を確認し、術前コース完遂後に根治切除を行う。
- ・ペメトレキセド投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
パンビタンはペメトレキセド投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
- ・ペメトレキセド初回投与7日以上前にシアノコバラミン1000 μgを筋肉内投与。その後約9週毎に反復投与。
シアノコバラミンはペメトレキセドの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。
- ・患者への注意事項:発熱、咳嗽、息切れ、下痢、倦怠感、皮疹などの症状が発現した場合は早期に医療機関へ連絡。術前は栄養状態・全身状態を維持し、術後は免疫療法継続の重要性について説明する。
- ・day1にパロノセトロン注0.75mg、アロカリス注235mg、デカドロン注3.3mg使用する。

登録年月日
2025年 12月 3日

登録No.
No. 658