

診療科  
泌尿器科

疾患名  
膀胱癌(筋層浸潤性)

レジメ名  
術前イミフィンジ+GC療法(腎機能正常)

投与間隔  
1コース 3 週間 計 4 コース

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間		投与日			
		単位	day1		day8	day	day	day	day	day
イミフィンジ(体重>30kg)	デュルバルマブ	1500	mg/body	点滴静注	1	時間	●			
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30	分	●	●		
シスプラチニ	シスプラチニ	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2	時間	●			
イミフィンジ(体重≤30kg)	デュルバルマブ	20	mg/kg	点滴静注	1	時間	●			
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30	分	●	●		
シスプラチニ	シスプラチニ	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2	時間	●			

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)  
静注用制吐剤として、Day1にアロカリス235mg、パロノセトロン0.75mg、DEX9.9mg、Day8にDEX3.3mgを投与する。  
GCイミフィンジ療法最大4コース終了後、根治的膀胱全摘術を行い、イミフィンジ療法(術後補助療法)へ移行する。  
Ccr≥60ml/minの症例に使用する。

登録年月日  
2025年 12月 10日

登録No.  
No. 665