

診療科
泌尿器科

疾患名
膀胱癌(筋層浸潤性)

レジメ名
術前イミフィンジ+GC療法(40≤CCr<60)

投与間隔
1コース 3週間 計 4コース

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間		day1	day8	投与日	
		単位	单位		時間	分			day	day
イミフィンジ(体重>30kg)	デュルバルマブ	1500	mg/body	点滴静注	1	時間	●			
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30	分	●	●		
シスプラチニ	シスプラチニ	35	mg/m ²	点滴静注	1.5	時間	●	●		
イミフィンジ(体重≤30kg)	デュルバルマブ	20	mg/kg	点滴静注	1	時間	●			
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30	分	●	●		
シスプラチニ	シスプラチニ	35	mg/m ²	点滴静注	1.5	時間	●	●		

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

静注用制吐剤として、Day1、8にグラニセトロン3mg、DEX6.6mgを投与する。

GCイミフィンジ療法最大4コース終了後、根治的膀胱全摘術を行い、イミフィンジ療法(術後補助療法)へ移行する。

Ccr40以上、60未満の症例に使用する。

登録年月日

2025年 12月 10日

登録No.

No. 666