

診療科
血液内科

疾患名
高リスクくすぶり型多発性骨髄腫

レジメ名
Daratumumab療法(1-2サイクル)

投与間隔
1サイクル 4週間 計 2 サイクル

| 商品名 | 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | day1 | day8 | day15 | day22 | day | day | day | day |
| ダラキューロ | ダラツムマブ | 1800mg/body | 皮下注 | 3-5分 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

備考 (実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)
静注用制吐剤なし
ダラツムマブ投与開始前1~3時間前に、副腎皮質ステロイド(メチルプレドニゾロン)、カロナール900mg、ポララミン2mgを内服する。
1サイクル目dayメチルプレドニゾロン60mgへ減量可能

*メチルプレドニゾロンは等価となる中時間型または長時間型ステロイドで代替可
初回投与時はモンテルカスト10mg併用を推奨。

登録年月日
2025年12月22日

登録No.
No. 668-1