

診療科
消化管内科

疾患名
BRAF陽性の切除不能な大腸がん

レジメ名
FOLFOX+ビラフトビ+セツキシマブ療法

投与間隔
1コース 2 週間 PD まで

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間		投与日				
		単位	単位		単位	単位	day1	day	day	day	day
フルオロウラシル	フルオロウラシル	400	mg/m ²	点滴静注	3~15	分	●				
フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	点滴静注	46	時間	●	→			
レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2	時間	●				
オキサリプラチン	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2	時間	●				
アービタックス	セツキシマブ	500	mg/m ²	点滴静注	2	時間	●				
ビラフトビ	エンコラフェニブ	300	mg/body	経口							day1-14

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)
静注用制吐剤としてday1にパロノセトロン0.75mg、デカドロン6.6mg使用する。
ビラフトビは連日一日一回内服し、症状に合わせて2段階まで減量できる。

登録年月日
2026年 3月 4日

登録No.
No. 677