

診療科
血液内科

疾患名
再発難治性ろ胞性リンパ腫

レジメ名
ミンジュビ®+リツキシマブ+レブラミド®療法
(1サイクル目)

投与間隔
1サイクル 4週間 計 1 サイクル

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間	投与日						
			単位			day1	day8	day15	day21	day22	day28	
ミンジュビ	タファシタマブ	12	mg/kg	点滴静注	*	●	●	●		●		
リツキシマブ	リツキシマブ	375	mg/m ²	点滴静注	*	●	●	●		●		
レブラミド	レナミドリド	20	mg/body	経口		day1-21						

備考（実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等）
ミンジュビのinfusion reaction軽減のため、1コース目は投与30-60分前にポラミン2mg、カロナール900mg内服およびデカドロン注13.2mgを投与する。
体重に応じてレジメンが異なる。
体重42kg以上の場合、ミンジュビを生理食塩水250mlで溶解。（688-1）
体重42kg未満の場合、ミンジュビを生理食塩水200mlで溶解。（688-5）
枝分かれレジメンあり。リツキシマブ分割投与。Day1のリツキシマブをDay2で実施。（688-9、688-10）

登録年月日
2026年6月3日

登録No.
No. 688-1