

診療科
血液内科

疾患名
再発難治性ろ胞性リンパ腫

レジメ名
ミンジュビ[®]＋リツキシマン[®]＋レブラミド[®]療法
(4-5サイクル目)

投与間隔
1サイクル 4週間 計 2 サイクル

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間	投与日							
		単位				day1	day8	day15	day21	day22	day28		
ミンジュビ	タファシタマブ	12	mg/kg	点滴静注	*	●		●					
リツキシマブ	リツキシマブ	375	mg/m ²	点滴静注	*	●							
レブラミド	レナミドリド	20	mg/body	経口		day1-21							

備考（実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等）
前コースでミンジュビのinfusion reactionを認めた場合は、投与30-60分前にポララミン2mg、カロナール900mg内服およびデカドロン注13.2mgの投与を考慮する。
前コースでミンジュビのinfusion reactionを認めない場合は、リツキシマブのinfusion reaction対策にカロナール300mg、ポララミン2mgを投与する。
体重に応じてレジメンが異なる。
体重42kg以上の場合、ミンジュビを生理食塩水250mlで溶解。(688-3)
体重42kg未満の場合、ミンジュビを生理食塩水200mlで溶解。(688-7)

登録年月日
2026年6月3日

登録No.
No. 688-3