

診療科
血液内科

疾患名
再発難治性多発性骨髄腫

レジメ名
BelaVd(1～8コース目)

投与間隔
1コース 3週間 計 8 コース

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間		投与日								
		単位			単位		day1	day2	day4	day5	day8	day9	day11	day12	day21
ブーレンレップ	ベランタマブマホドチン	2.5	mg/kg	点滴静注	30	分	●								
ボルテゾミブ	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注			●		●		●		●		
レナデックス	デキサメサゾン	20	mg/body	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	

備考（実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等）
75歳以上の患者ではDEX減量する
ブーレンレップの初回から4回目までの各投与前に必ず眼科医の診察を行う。
眼の有害事象が高頻度のため、必要に応じて視力検査・細隙灯顕微鏡検査など眼科検査を実施する。
角膜検査所見及び視力変化によりブーレンレップの減量を行った場合は、再増量しない。
ブーレンレップ投与終了1時間後にベルケイド投与

登録年月日
2026 年 6 月 3 日

登録No.
No. 690-1