

診療科
呼吸器内科

疾患名
肺腺癌

レジメ名
リブロファス[®]+CBDCA+PEM療法
(1コース目・BW80kg未満)

投与間隔
1コース 3週間 計 1 コース

商品名	一般名	投与量		投与方法	投与時間		投与日				
		単位			単位		day1	day8	day15	day	day
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	1	時間	●				
ペメトレキセド	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	10	分	●				
リブロファス	アミバンタマブ	1600	mg/body	皮下注	5	分	●				
リブロファス	アミバンタマブ	2400	mg/body	皮下注	5	分		●	●		

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)
体重 80kg未満と80kg以上でリブロファス投与量が変わる
診療科と協議の上、infusion reaction予防はライブリバンドと同様に、
初回(d1)は原則2日前～当日朝まで、デキサメタゾン8mg/回 朝・夕で内服。
リブロファス開始60分前にカロナール900mg+ポララミン2mgを内服する。
Exon20ins/EGFR 19del、L858R陽性で使用

登録年月日
2026年 3月 4日

登録No.
No. 679-1