

診療科
血液内科

疾患名
ホジキン病

レジメ名
COPP／ABV Hybrid療法

投与間隔
1コース 4週間

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
						day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day9	day10	day11	day12	day13	day14
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ² /day	div		●													
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m ² /day	iv or div		●													
ナツラン	プロカルバジン	PCZ	100mg/m ² /day	po		●	●	●	●	●	●	●							
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	40mg/m ² /day	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドキシソルビン	ドキシソルビン	ADM	35mg/m ² /day	div									●						
ブレオ	ブレオマイシン	BLM	10mg/m ² /day	div									●						
エクザール	ビンブラスチン	VLB	6mg/m ² /day	iv or div									●						
ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン		100mg/body/day	iv or div									●						

備 考

骨髄抑制を来す薬剤(CPA,PCZ,VLB)は、末梢血顆粒球数800/μ l以上1600/μ l以下或いは血小板75000/μ l以上125000/μ l以下の場合は50%減量。
 末梢血顆粒球数800/μ l未満または血小板75000/μ l未満の場合は治療を1週間延期。
 骨髄への浸潤を伴っている場合は、末梢血の血算によらず最初の1コースは減量せず施行。
 重篤な知覚障害或いは運動神経障害が出現した場合は、VCRを中止。
 VCRによる腸管麻痺が起こった場合は、それ以後の投与量を50%減量。
 呼吸器症状を有する場合またはDlcoが治療前の50%以下に低下した場合は、BLMの投与は中 CPA、PCZを50%減量

登録年月日
2004 年 3月 18日

登録No.
No. 010