

診療科  
腫瘍内科

疾患名  
乳癌

レジメ名  
weekly PTX+BV

投与間隔  
1コース  
2 週間

| 商品名   | 一般名     | 略号  | 投与量 |                   | 投与方法 | 投与時間    |    | 投与日  |      |     |     |     |     |
|-------|---------|-----|-----|-------------------|------|---------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|
|       |         |     |     | 単位                |      |         | 単位 | day1 | day8 | day | day | day | day |
| アバスチン | ベバシズマブ  | BV  | 10  | mg/kg             | 点滴静注 | 1.5-0.5 | 時間 | ●    |      |     |     |     |     |
| タキソール | パクリタキセル | PTX | 80  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 1       | 時間 | ●    | ●    |     |     |     |     |
|       |         |     |     |                   |      |         |    |      |      |     |     |     |     |

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

ベバシズマブ: 高血圧、蛋白尿に注意する。  
パクリタキセル: 好中球1000以上、血小板7.5万以上、その他の有害事象がGr2以下で投与可能

・day1、8にグラニセトン注3mg、デカドロン注3.3mg使用

登録年月日  
2023 年 9 月 6 日

登録No.  
545